

Producto Abamectina
Presentación Etiqueta 1,000 y 200 lts
Medida 276 x 146 mm.



27.6 cm

"ALTO. LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
 Durante su manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, guantes, gafas y guantes). El producto sobrante se debe conservar en su envase original y manteniéndolo perfectamente cerrado por un lapso máximo de 30 días.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
 NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO; "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROSA O FORRAJES"; "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"; "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTO"; "NO ALMACENE EN CERCAS HABITACIONES"; "NO VIRE EL PRODUCTO NI EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"; "LOS MENORES DE 16 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"; "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BARRER E PREPARAR ROSA LIMPIA"; "NO SE INGENIERA, INHALE Y ENTUSESE EN CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"; "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTE ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación leve al paciente a un lugar ventilado. Si respira con dificultad, debe administrarse oxígeno por una persona capacitada. Si el paciente vomita aspirarlo inmediatamente. Si el paciente está inconsciente, mantenerlo en posición lateral de seguridad. Si el paciente está consciente, ofrecerle agua y leche. Si el paciente vomita, limpiarle la boca con abundante agua y jabón, si la intoxicación persiste conlleva atención médica. Evite ingerir alcohol. Lleve la ropa antes de reingresar. Si los contactos con los ojos lavados con abundante agua por los menos durante 15 minutos. En caso de ingestión leve la boca con bates de agua y proporcionar al paciente agua fría con sal e induce al vómito, se reducen los efectos si se realiza esta operación dentro de los primeros treinta minutos. Se recomienda realizar un lavado gástrico, efectuando al nivel de atención de intoxicación. No inducir el vómito y suministrar nada por vía oral si una persona

RECOMENDACIONES AL MEDICO
 Grupo químico: ADAMANTINOS. 1,8 CE es del grupo de las Aromáticas [Estructura Icteronmetacíclica].
ANTICANCER Y TRATAMIENTO ESPECIFICO: No tiene evidencia específica por lo cual deberá proponerse el tratamiento sintomático.
SEÑALES Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Tórax, producción de mucosidad, respiración agitada, náuseas, vómitos, dolor abdominal y depresión del sistema nervioso central. En algunos pacientes puede causar sensibilidad de la piel. El contacto directo del producto en los ojos, puede causar destrucción del tejido. Si se ha ingerido el producto se puede realizar lavado gástrico con agua, bicarbonato de sodio o solución de ferriacetato de potasio al 0.5%. El lavado se continúa hasta que se evite daño a la mucosa.

[illegible]

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA
ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO DE LAS MAÍZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: AG KEM, S.A. DE C.V. solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El cliente es responsable de la conservación, almacenamiento, uso, aplicación y disposición de los residuos generados.

USO AGRÍCOLA

ABAMECTINA
1.8 CE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% En Peso
INGREDIENTES ACTIVOS:		
Abaractina (Avermectina): Avermectin B1 (Ectolevato a 10 g de a.i. a 20°C)		1.80
INGREDIENTES INERTES:		
Solvente y emulsificante.		98.20
	TOTAL:	100.00

REG. RSCD-NAC-0174-342-009-002

CONTENIDO NETO: 1 l.


NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
AG KEM SA DE CV, S.A. de C.V.
 Blvd. Puerta de Hierro 5153,
 Piso 2, Oficina 219
 Col. Puerta de Hierro,
 Pinar del Río, México
 45116 Zecococ, Jalisco

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS.
INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

ABAMECTINA 1.8 CE es un insecticida y/o acaricida agrícola formulado como concentrado emulsionable. Recomendado para el control de los ácaros y arácnidos que se mencionan en el cuadro siguiente:

[illegible]

[] Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de la aplicación

MÉTODO DE PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO: Antes de usar el producto agite el envase. Abrá cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter al producto al equipo de aplicación, realice una prueba, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de ABAMECTINA 1.8 CE a utilizar; agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la preparación en el tanque de mezcla. Agregue agua (líquido de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla. Aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: Realice las aplicaciones de ABAMECTINA 1.8 CE en las primeras horas de la mañana o por la tarde. No aplique ABAMECTINA 1.8 CE en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte (15 km/h). No debe ser aplicado, ni manipulado sin el equipo de protección adecuada.

FITOTOXICIDAD: ABAMECTINA 1.8 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: ADAMECTINA 1.8 CE es compatible con otros plaguicidas y deberán mezclarse sólo con productos que tengan registros vigentes otorgados por la autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados. Es recomendable realizar una prueba preliminar, con el fin de observar las reacciones que pueda tener la mezcla y en el cultivo durante los tres días siguientes a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO. ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOJIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

PELIGRO

