Producto Kaima 41
Presentación Etiqueta 1, 5, 10 y 20 L
Medida 276 x 146 mm.

AGKEM

27.6 cm

14.6 cm

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado; overol de algodón, gorra impermeable, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar en el lugar de trabajo y bajo llave después de la jornada laboral.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
• “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
• “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
• “LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
• “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
• “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
• “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
• “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
• “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
• “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
• “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”
Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
En caso de inhalación: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuague los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15-20 minutos. Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón por 15-20 minutos. Dar atención médica en caso de presentar irritación. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **En caso de ingestión:** No dar de tomar nada a una persona inconsciente y busque atención médica inmediatamente. Si la persona esta consciente y alerta puede inducir el vómito.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”
Grupo químico: Fosfonoglicina
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Vía inhalatoria: Dolor de cabeza y debilidad. **Vía ocular y dermal:** Puede ocasionar irritación. **Vía Oral: Vómito y diarrea.**
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y condición clínica de la persona.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
“ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES)”.

GARANTÍA:
AG KEM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a las composición porcentual y descripción química de esta etiqueta siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta de **AG KEM S. A. de C. V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

USO AGRÍCOLA

KAIMA 41

Sal Isopropilamina de glifosato
Herbicida Agrícola / Concentrado soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	**% En Peso**
INGREDIENTES ACTIVOS:	
Sal isopropilamina de glifosato: 2-(fosfonometilamino) acetato	
Con un contenido de ácido glifosato de 74.13%	41 %
(Equivalente a 480 g de sal isopropilamina de glifosato/L a 20ºC con un contenido de 356 g de ácido glifosato/L a 20ºC)	
INGREDIENTES INERTES:	
Surfactante y disolvente	59 %
TOTAL:	**100 %**

No. de Registro único: RSCO-HEDE-0230-X0229-013-41.0

CONTENIDO NETO: ☐ **1L** ☐ **5L** ☐ **10L** ☐ **20L**

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
AG KEM S.A. de C.V.
Blvd. Puerta de Hierro 5153,
Piso 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Fracc, Paseo Andares,
45116 Zapopan, Jal.

“HECHO EN MÉXICO”

AGKEM

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

KAIMA 41 es un herbicida sistémico no selectivo para aplicación en post-emergencia de maleza anual y perene. Este producto debe ser aplicado sobre maleza joven en crecimiento activo, es absorbido por el follaje y se trasloca por toda la planta hasta las raíces y estolones. Es un producto no residual, por lo que no afecta a los cultivos posteriores.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/HA
Agave, aguacate, cacao, cafeto, cebada, ciruelo, cítricos, durazno, frijol, guayabo, maíz, mango, manzano, nectarino, nogal, peral, plátano, sorgo, soya, trigo, vid. (SL) 4	Cola de ardilla, liendrilla / *Eragrostis mexicana* Luzaga, zacate pata de gallina / *Digitaria sanguinalis* Pasto de conejo, zacate mota / Chloris virgata Zacate camalote, zacate horquetilla / *Brachiaria plantaginea* Zacate rayado / *Echinochloa crus-gall*	1.0-2.0
Agave. (SL)	Bledo común / *Amanthus spinosus*	1.0-3.0
Ajo, cebolla. (SL)	Estrellita, rosilla chica / *Galinsoga parviflora* Hierba del pastor / *Acalypha virginica* Perita, perilla / *Lopezia racemosa* Quelite cenizo / *Chenopodium album* Quintonil / *Amaranthus hybridus*	1.5-2.5
Agave, aguacate, cacao, cafeto, cebada, ciruelo, cítricos, durazno, frijol, guayabo, maíz, mango, manzano, nectarino, nogal, peral, plátano, sorgo, soya, trigo, vid. (SL)	Bledo común / *Amanthus spinosus* Bolsa del pastor / *Capsella bursa-pastoris* Campanilla, correhuela anual / *Ipomoea purpurea* Hierba mora / *Solanum nigrum* Lampotillo, gigantón, acahual / *Tithonia tubaeiformis* Mala mujer / *Solanum nigrum* Malva / *Malva sp* Quelite cenizo / *Chenopodium album* Quelite, biedo / *Amanthus albus* Verdolaga / *Portulaca oleracea* Zacate rayado / *Echinochloa crus-galli*	1.5-3.0
Algodón transgénico (g-12). (SL)	Bledo rojo / *Amanthus retroflexus* Amargosa / *Panthenium hysterophus* Cola de zorra / *Setaria viridis* Zacate rayado / *Echinochloa crus-galli*	3.0-3.5[1]
Frambuesa, zarzamora. (SL)	Pata de gallina / *Eleusine indica* Zacate cadillo / *Panthenium hysterophus* Zacate pitillo / *Ixophorus unisetus*	2.0-3.0[2]
Cacao. (SL)	Hierba del pollo / *Commelina erecta* Oreja de elefante / *Anthurium spp* Zacate perfumado / *Oplishmenus hirtellus*	2.0-3.0[3]
Acelga, aguacate, avena, cacao, cafeto, guayabo, mango, nectarino. (SL)	Zacate Johnson / *Sorghum halepense*	2.0-4.0
Berenjena, moztaza. (SL)	Lechosa, golondrina / *Eurphobia heterophylla*	
Ajo, alcachofa, alfalfa, apio, betabel, brócoli, cacahuate, calabaza, cebada, cebolla, centeno, cirulo, cítricos, coliflor, chicharo, chile, durazno, espinaca, frijol, jitomate, lechuga, maíz, manzano, melon, nogal, papa, pastos, pepino, peral, plátano,rábano, sandía, sorgo, soya, trigo, vid, zanahoria. (SL)	Bledo rojo / *Amanthus retroflexus* Lechosa, golondrina / *Eurphobia heterophylla* Zacate Johnson / *Sorghum halepense*	
Cafeto, calabaza, caña de azúcar, cebada, cebolla, centeno, ciruelo, coliflor, chile, chicharo, durazno, espinaca, frijol, guayabo, jitomate, lechuga, limonero, maíz,mango, manzano, melón, mostaza, nogal, papa, papayo, pastos, pepino, peral, plátano, rábano, sandía, sorgo, trigo, vid, zanahoria. (SL)	Lampotillo, gigantón, acahual / *Tithoniatubaeiformis*	3.0-4.0
Acelga, agave, aguacate, ajo, alcachofa, alfalfa, apio, arroz, avena, berenjena, betabel, brócoli, cacahuate, cacao. (SL)	Coquillo / *Cyperus esculentus* Estrellita, rosilla chica / *Galinsonga parviflora* Guinar, maravilla / *Sida rhombifolia* Lampotillo, gigantón, acahual / *Tithoniatubaeiformis* Lengua de vaca / *Rumex crispus* Mala mujer / *Solanum nigrum* Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana / *Cynodon dactylon* Zacate guinea / *Panicum maximum*	
Acelga. (SL)	Acahualilo, mozote / *Bidens pilosa* Lechosa / *Euphorbia heterophylla*	3.0-5.0
Plátano. (SL)	Acahualillo / *Bidens pillosa* Arroz rojo / *Oryza sativa* Borrería, botón blanco / *Borrería ocymoides* Cola de zorra / *Setaria lutescens* Coquillo, coyotillo / *Cyperus rotundus* Golondrina, arlomo / *Boerhavia erecta* Mozote, zacate cadilo / *Cenchrus echinatus* Pata de gallo / *Eleusine indica* Rosilla / *Galinsoga hispida* Zacate / *Hyparrhenia rufa* Zacate / *Paspalum virgatum* Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana / *Cynodon dactylon* Zacate guinea / *Panicum maximum* Zacate hierba del conejo / *Digitaria filiformis* Zacate pitillo / *Ixophorus unisetus*	4.0
Agave, berenjena, betabel, cacahuate, plátano. (SL)	Coquillo / *Cyperus sp*	4.0-6.0
Apio. (SL)	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana / *Cynodon dactylon*	
Aguacate, ajo, alcachofa, alfalfa, avena, brócoli, cacao, cafeto, calabaza, cebada, cebolla, centeno ciruelo, cítricos, coliflor, chícharo, chile, durazno, espinaca, frijol, guayabo, jitomate, lechuga, maíz, mango, manzano, melón, mostaza, nectarino, nogal, papa, pastos, pepino, peral, rábano, sandía, sorgo, soya, trigo, vid, zanahoria. (SL)	Bledo rojo / *Amanthus retroflexus* Coquillo / *Cyperus sp* Coquillo, coyolillo / *Cyperus rotundus* Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana / *Cynodon dactylon*	
Acelga, agave, aguacate, ajo, alcachofa, alfalfa, apio, arroz, avena, berenjena, betabel, brócoli, cacahuate, cacao, cafeto, calabaza, cebada, cebolla, centeno, ciruelo, cítricos, coliflor, chícharo, chile, durazno, espinaca, frijol, guayabo, jitomate, maíz, mango, manzano, melón, mostaza, nectarino, nogal, papa, pastos, pepino, peral, plátano, rábano, sandía, sorgo, soya, trigo, vid, zanahoria. (SL)	Bledo rojo / *Amanthus retroflexus* Correhuela, gloria de la mañana / *Convolvulus arvensis*	4.0-8.0
Aguacatae, cítricos, plátano, (SL)	Hierba del pollo / *Commelina erecta*	5.0
Caña de azúcar. (SL)	Campanilla / *Ipomoe purpurea* Zacate de agua / *Echinochloa* Zacate Johnson / *Sorghum halepense* Zacate pitillo / *Ixophorus*	5.0-6.0
Apio. (SL)	Coquillo / *Cyperus sp*	6.0
Cítricos. (SL)	Acahualillo / *Bidens pilosa* Cola de zorra / *Setaria lutescens* Coquillo, coyolillo* / *Cyperus rotundus* Flor amarilla / *Melampodium divaricatum* Golondrina, arlomo / *Boerhavia erecta* Pata de gallo / *Eleusine indica* Quelite, bledo / *Amaranthus albus* Rosilla / *Galinsoga hispida* Zacate / *Hyparrhenia rufa* Zacate / *Paspalum virgatum* Zacate guinea / *Panicum maximum* Zacate hierba de conejo / *Digitaria filiformis* Zacate pitillo / *Ixophorus unisetus*	

(Intervalo de seguridad): *Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.* ***SL:*** *Sin límite*
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: *24 horas*

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Siempre use el equipo de protección descrito en la sección “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de esta etiqueta. Con el equipo de seguridad puesto, quite la tapa de rosca girando en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **KAIMA 41** de acuerdo a las dosis indicadas, mantener la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante mantener la agitación durante la aplicación. Para obtener los mejores resultados, aplique durante las etapas de crecimiento activo de la maleza. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 400 a 600 litros de agua por hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo a la altura y cantidad de follaje de la maleza. No permita que la brisa del herbicida llegue a las partes verdes del cultivo, dirija la aspersión a la maleza utilizando campana protectora. Se recomienda utilizar un coadyuvante no iónico a dosis de 0.1%.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando la maleza es muy pequeña o se encuentra bajo estrés por sequía o cuando se espera lluvia, ya que lluvias inmediatas después de la aplicación pueden reducir el control de las malezas. No aplicar con vientos mayores de 8 Km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.
INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda **KAIMA 41** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.
MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN