



RSCO-HEDE-0204-X0647-420-90.0
HERBICIDA / GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% En Peso

INGREDIENTES ACTIVOS:

ATRAZINA:

6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
(equivalente a 900.0 g de i.a./kg).

90.0 %

INGREDIENTES INERTES:

Surfactante, humectante y diluyente.

10.0%

TOTAL: 100.00%



GLORY 90 es un herbicida no selectivo que tiene actividad pre-emergente y post-emergente, con acción sistémica y con poder residual que es favorecido por condiciones de alta humedad.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Siempre use el equipo de protección: gorra impermeable, overol de algodón, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra polvos, guantes y botas de neopreno.

Abra el envase tomando firmemente la bolsa, corte por uno de los ángulos, evite tirar o entrar en contacto directo con el producto. Mezcla la dosis de este producto en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. Llenar el tanque con agua limpia hasta mas de la mitad de su capacidad, agregar la cantidad recomendada de producto, agitando continuamente, agréguese finalmente el resto de agua. Realice las aplicaciones a favor del viento.

CONTRAINDICACIONES. No aplique el producto en horas de intenso calor ni cuando el viento exceda los 15 km/h, ni cuando exista la alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD. No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No se mezclarse con otros plaguicidas.

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:

Inhalación: Si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **Contacto con los ojos:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. **Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, quite al paciente la ropa contaminada y los zapatos de ser necesario, lave la parte afectada con abundante agua limpia y jabón para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. **Si fue ingerido:** No provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca a una persona inconsciente o semiinconsciente.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de los síntomas y condición clínica.

CULTIVO	MALEZA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Maíz, Sorgo (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) / Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) / Zacate casamiento (<i>Eragrostis mexicana</i>) / Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>) / Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) / Correhuela (<i>Ipomoea purpurea</i>) / Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) / Zacate horquetilla (<i>Brachiaria sp.</i>) / Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) / Lupino (<i>Lupinus polyphyllus</i>) / Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) / Caperonia (<i>Caperonia palustris</i>) / Chilillo (<i>Polygonum punctatum</i>) / Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Hierba de paloma (<i>Euphorbia hirta</i>) / Chipilin (<i>Crotalaria sp.</i>) / Hierba de pájaro (<i>Anagallis arvensis</i>) / Gigantón o acahual (<i>Tithonia tubaeformis</i>) / Toloache común (<i>Datura stramonium</i>) / Malva (<i>Malva parviflora</i>) / Llantén mayor (<i>Plantago major</i>) / Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) / Cola de zorra (<i>Setaria glauca</i>) / Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>) / Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) / Estrellita (<i>Galinsoga parviflora</i>) / Anisillo (<i>Fumaria officinalis</i>) / Acahual (<i>Encelia mexicana</i>) / Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) / Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>)	1.5 – 3.0	Realizar una aplicación total dirigida al suelo después de la siembra, en pre-emergencia al cultivo y a la maleza. Volumen de aplicación sugerido 250 - 350 L de agua/ha.
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Arroz (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) / Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) / Estrellita (<i>Galinsoga parviflora</i>) / Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) / Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) / Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>) / Zacate casamiento (<i>Eragrostis mexicana</i>) / Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
Caña de azúcar (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) / Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) / Lupino (<i>Lupinus polyphyllus</i>) / Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) / Caperonia (<i>Caperonia palustris</i>) / Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) / Cola de zorra (<i>Setaria glauca</i>) / Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) / Estrellita (<i>Galinsoga parviflora</i>) / Zacate pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) / Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) / Chilillo (<i>Polygonum punctatum</i>) / Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>) / Hierba de paloma (<i>Euphorbia hirta</i>) / Chipilin (<i>Crotalaria sp.</i>) / Hierba del pájaro (<i>Anagallis arvensis</i>) / Gigantón o acahual (<i>Tithonia tubaeformis</i>) / Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>) / Toloache común (<i>Datura stramonium</i>) / Malva (<i>Malva parviflora</i>) / Llantén mayor (<i>Plantago major</i>) / Anisillo (<i>Fumaria officinalis</i>) / Acahual (<i>Encelia mexicana</i>)	2.0 – 2.5	Realizar una aplicación total dirigida al suelo en pre-emergencia a la maleza, antes de la brotación de la caña. Volumen de aplicación sugerido 300-400 L de agua/ha.