



RSCO-INAC-0101Y-X0722-064-44.20
INSECTICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% En Peso

INGREDIENTES ACTIVOS:

Spinosad: mezcla de spinosina A y spinosina D
 (con un contenido de 87.0% spinosina A y 13.0% spinosina D)
 Equivalente a 480 g de i.a./L a 20 °C


44.20 %

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, espesantes, anticongelante, antiespumante y diluyente

55.80 %

TOTAL: 100.00%



KOROS es un insecticida que actúa sobre la plaga y en los cultivos mencionados en el cuadro de recomendaciones.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, retire el sello de seguridad y quite la tapa de rosca. Abra el envase de **KOROS** utilizando el equipo de protección: gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra nieblas, guantes y botas de neopreno. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, mida con una probeta de plástico la cantidad de **KOROS** a utilizar y adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES. **KOROS** no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, y que puede haber un lavado de producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD. **KOROS** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de su etiqueta.

COMPATIBILIDAD. No definida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

ALMACENAMIENTO. Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Lechuga, Espinaca, Acelga Apio* (1)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	40 – 60 mL/ha	*Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 200 L de agua/ha. **Aplicación foliar.
Algodonero** (28)	Gusano bellotero (<i>Heliothis virescens</i>) Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	100-125 mL/ha	
	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	75 – 100 mL/ha	
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Colza, Colinabo** (1)	Palomilla dorso de diamante (<i>Prutella xylostella</i>)	25 mL/ha	
	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano importado de la col (<i>Pieris rapae</i>) Gusano de la col (<i>Leptophobia aripa</i>)	50 mL/ha	
Berenjena, Chile, Tomate verde, Jitomate, Papa, Pimiento morrón** (1)	Trips (<i>Frankliniella spp.</i>)	100 – 125 mL/ha	
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	75 – 100 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 320 L de agua/ha.
	Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	100 – 125 mL/ha	
Pepino, Melón, Calabaza Calabacita, Sandía, Chayote** (3)	Barrenador del fruto (<i>Diaphania hyalinata</i>)	62.5 – 87.5 mL/ha	
Frambuesa, Zarzamora, Fresa (1)	Trips de las flores (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Trips (<i>Scirtothrips sp.</i>)	100 – 165 mL/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se observen los primeros trips en las inflorescencias. Volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Arándano (3)			
Vid (7)			
Aguacate (1)	Trips de las flores (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Trips del aguacate (<i>Scirtothrips perseae</i>)	6.25 – 7.5 mL/100L de agua	

IMPORTANTE:

La información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni aplica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.